

Alliance pancanadienne pharmaceutique : négociations actives

En date du 31 mars 2016

À l'heure actuelle, 22 négociations sont **en cours** pour les produits pharmaceutiques suivants :

Produit pharmaceutique Novateur (Nom générique)	Indication/usage
Avastin (bevacizumab)	Utilisé pour le traitement du cancer colorectal métastatique.
Cosentyx (sécukinumab)	Utilisé pour le traitement du psoriasis en plaques modéré ou grave.
Cyramza (ramucirumab)	Utilisé pour le traitement du cancer gastrique métastatique et gastro-intestinal ou de l'adénocarcinome de la jonction œsogastrique.
inhibiteurs de la DPP-4 (sitagliptine, saxagliptine, linagliptine)	Utilisé pour le traitement du diabète de type 2.
Esbriet (pirféridone) demande présentée de nouveau	Utilisé pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique.
Iclusig (ponatinib)	Utilisé pour le traitement de la leucémie myéloïde chronique (LMC) / la leucémie aiguë lymphoblastique.
Jardiance (empagliflozine)*	Utilisé pour le traitement du diabète de type 2.
Kalydeco (ivacaftor)	Utilisé pour le traitement de la fibrose kystique avec la mutation G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N, S549R, ou G970R.
Lemtrada (alemtuzumab)	Utilisé pour le traitement des personnes atteintes de SP cyclique (poussées-rémissions).
Neupro	Utilisé pour le traitement de la maladie de Parkinson.
Ofev (nintédanib)	Utilisé pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI).
Prolia (denosumab)	Utilisé pour le traitement de l'ostéoporose.
Revlimid (Lénalidomide)	Utilisé pour le traitement du myélome multiple nouvellement diagnostiqué.
Simponi (golimumab) IV	Utilisé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde.
Simponi (golimumab) SC	Utilisé pour le traitement de la colite ulcéreuse.
Sylvant (siltuximab)	Utilisé pour le traitement de la maladie de Castleman multicentrique.
Tafinlar (dabrafénib) et Mekinist (tramétinib)	Utilisé pour le traitement du mélanome métastatique (en combinaison).
Tobi Podhaler (tobramycine)	Utilisé pour la gestion des patients atteints de fibrose kystique ayant une infection pulmonaire chronique à <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .
Vectibix (panitumumab)	Utilisé pour le traitement du cancer colorectal métastatique.
Xeljanz (tofacitinib)	Utilisé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde.
Xolair (omalizumab)	Utilisé pour le traitement de l'urticaire idiopathique chronique.
Zydelig (idélalisib)	Utilisé pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique (LLC).

* Nouveau produit pharmaceutique depuis la dernière mise à jour du 29 février 2016.