

## Alliance pancanadienne pharmaceutique : négociations actives

En date du 31 mai 2017

À l'heure actuelle, 43 négociations sont **en cours** pour les produits pharmaceutiques suivants :

Produit pharmaceutique Novateur (Nom générique)	Indication/usage
<b>Afinitor (évérolimus)</b>	Utilisé pour le traitement des tumeurs neuroendocrines d'origine gastro-intestinale ou pulmonaire.
<b>Avastin (bevacizumab)</b>	Utilisé pour le traitement du cancer génito-urinaire ovarien résistant au platine.
<b>Avastin (bevacizumab)</b>	Utilisé pour le traitement du cancer colorectal métastatique.
<b>Basaglar (insuline glargine)</b>	Utilisé pour le traitement du diabète de type 1 et 2.
<b>Botox (onabotulinumtoxin A)</b>	Utilisé pour le traitement de multiples indications.
<b>Brenzys (etanercept)</b>	Utilisé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et de la spondylarthrite ankylosante.
<b>Brivlera (brivaracétam)*</b>	Utilisé pour le traitement des crises d'épilepsie partielles.
<b>Butrans (buprénorphine)*</b>	Utilisé pour le traitement des douleurs persistantes d'intensité modérée.
<b>Campral (calcium d'acamprosate)</b>	Utilisé pour le maintien de l'abstinence d'alcool.
<b>Copaxone (acétate de glatiramère)</b>	Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques.
<b>Cosentyx (sécukinumab)</b>	Utilisé pour le traitement de la polyarthrite psoriasique.
<b>Cosentyx (sécukinumab)</b>	Utilisé pour le traitement de la spondylarthrite ankylosante.
<b>Erelzi (étanercept)</b>	Utilisé pour le traitement de la spondylarthrite ankylosante, de la polyarthrite idiopathique juvénile, et l'arthrite rhumatoïde.
<b>Fycompa (pérampanel)</b>	Utilisé pour le traitement de l'épilepsie généralisée primaire, se manifestant par des crises tonico-cloniques.
<b>Ibrance (palbociclib)*</b>	Utilisé pour le traitement du cancer du sein avancé.
<b>Imbruvica (ibrutinib)</b>	Utilisé pour le traitement du lymphome à cellules du manteau en rechute ou réfractaire.
<b>Imbruvica (ibrutinib)</b>	Utilisé pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique et le lymphome lymphocytaire à petites cellules.
<b>Invega Trinza (palmitate de palipéridone)*</b>	Utilisé pour le traitement de la schizophrénie.
<b>Invokamet (canagliflozine/chlorhydrate de metformine)*</b>	Utilisé pour le traitement du diabète de type 2.
<b>Jakavi (ruxolitinib)</b>	Utilisé pour le traitement de la polycythémie vraie.
<b>Jardiance (empagliflozine)</b>	Utilisé pour le traitement du diabète de type 2 auprès de patients présentant un risque cardiovasculaire élevé.
<b>Kalydeco (ivacaftor)</b>	Utilisé pour le traitement de la fibrose kystique avec la mutation G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N, S549R, ou G970R.
<b>Kyprolis (carfilzomib)</b>	Utilisé pour le traitement du lymphome ou du myélome.

Produit pharmaceutique Novateur (Nom générique)	Indication/usage
<b>Keytruda (pembrolizumab)</b>	Utilisé pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules.
<b>Kuvan (dichlorhydrate de saproptérine)*</b>	Utilisé pour le traitement de la phénylcétonurie.
<b>Lenvima (lenvatinib)</b>	Utilisé pour le traitement du cancer de la thyroïde.
<b>Metoject (méthotrexate)</b>	Utilisé pour le traitement de l'arthrite rhumatoïde.
<b>Mifegymiso (mifépristone/misoprostol)*</b>	Utilisé pour l'interruption médicale de grossesse.
<b>Mozobil (plérixafor)</b>	Utilisé pour le traitement du lymphome non hodgkinien et de myélome multiple.
<b>Neupro (rotigotine)</b>	Utilisé pour le traitement de la maladie de Parkinson.
<b>Nucala (mépolizumab)</b>	Utilisé pour le traitement de l'asthme éosinophile sévère.
<b>Pheburane (sodium de phénylbutyrate)</b>	Utilisé pour le traitement des anomalies du cycle de l'urée.
<b>Praluent (alirocumab)</b>	Utilisé pour réduire le taux de cholestérol à lipoprotéines de basse densité (LDL) auprès de patients atteints d'hypercholestérolémie familiale hétérozygote (HeFH), ou auprès de patients présentant un risque d'événement cardiovasculaire (CV) élevé.
<b>Prolia (denosumab)</b>	Utilisé pour le traitement de l'ostéoporose.
<b>Quinsair (lévofloxacine)*</b>	Utilisé pour le traitement de la fibrose kystique avec infection chronique à <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .
<b>Ravicti (phénylbutyrate de glycérol)</b>	Utilisé pour le traitement des anomalies du cycle de l'urée.
<b>Repatha (evolocumab)</b>	Utilisé pour le traitement de l'hyperlipidémie primaire et la dyslipidémie mixte.
<b>Taltz (ixékizumab)*</b>	Utilisé pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère.
<b>Uptravi (sélexipag)</b>	Utilisé pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire.
<b>Vimizim (élosulfase alfa)</b>	Utilisé pour le traitement de la mucopolysaccharidose de type IVA (syndrome de Morquio A).
<b>Votrient (chlorhydrate de pazopanib)*</b>	Utilisé pour le traitement du carcinome rénal métastatique génito-urinaire.
<b>XigDuo (dapagliflozine/metformine/hydrochloride)</b>	Utilisé pour le traitement du diabète de type 2.
<b>Xolair (omalizumab)</b>	Utilisé pour le traitement de l'asthme persistant grave.

\* Nouveaux produits pharmaceutiques depuis la dernière mise à jour du 30 avril 2017.