

## Alliance pancanadienne pharmaceutique : négociations actives

En date du 31 octobre 2016

À l'heure actuelle, 39 négociations sont **en cours** pour les produits pharmaceutiques suivants :

Produit pharmaceutique Novateur (Nom générique)	Indication/usage
<b>Abilify (aripiprazole)</b>	Utilisé pour le traitement de la schizophrénie et des troubles psychotiques apparentés.
<b>Avastin (bevacizumab)</b>	Utilisé pour le traitement du cancer génito-urinaire ovarien résistant au platine.
<b>Avastin (bevacizumab)</b>	Utilisé pour le traitement du cancer colorectal métastatique.
<b>Basaglar (insuline glargine)</b>	Utilisé pour le traitement du diabète de type 1 et 2.
<b>Blinicyto (blinatumomab)</b>	Utilisé pour le traitement de la leucémie aiguë lymphoblastique.
<b>Cotellic (cobimétinib)</b>	Utilisé pour le traitement du mélanome métastatique.
<b>Inhibiteurs de la DPP-4 (sitagliptine, saxagliptine, linagliptine)</b>	Utilisé pour le traitement du diabète de type 2.
<b>Entresto (sacubitril/valsartan)</b>	Utilisé pour le traitement de l'insuffisance cardiaque.
<b>Entyvio (védolizumab)</b>	Utilisé pour le traitement de la colite ulcéreuse.
<b>Fycompa (pérampanel)</b>	Utilisé pour le traitement de l'épilepsie généralisée primaire, se manifestant par des crises tonico-cloniques.
<b>Genvoya (elvitégravir/cobicistat/emtricitabine/ténofovir/alafenamide)</b>	Utilisé pour le traitement de l'infection par VIH.
<b>Grastofil (filgrastim)</b>	Utilisé pour le traitement de la neutropénie.
<b>Humira (adalimumab)</b>	Utilisé pour le traitement de la colite ulcéreuse.
<b>Imbruvica (ibrutinib)</b>	Utilisé pour le traitement du lymphome à cellules du manteau en rechute ou réfractaire.
<b>Inflectra (infliximab)*</b>	Utilisé pour le traitement de la spondylarthrite ankylosante, du psoriasis en plaques, de l'arthrite psoriasique, de la polyarthrite rhumatoïde, maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse.
<b>Jakavi (ruxolitinib)</b>	Utilisé pour le traitement de la polycythémie vraie.
<b>Jardiance (empagliflozine)</b>	Utilisé pour le traitement du diabète de type 2 auprès de patients présentant un risque cardiovasculaire élevé.
<b>Kalydeco (ivacaftor)</b>	Utilisé pour le traitement de la fibrose kystique avec la mutation G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N, S549R, ou G970R.
<b>Kyprolis (carfilzomib)*</b>	Utilisé pour le traitement du lymphome ou du myélome.
<b>Metadol-D (chlorhydrate de méthadone)*</b>	Utilisé pour le traitement de la dépendance aux opiacés.
<b>Metoject (méthotrexate)</b>	Utilisé pour le traitement de l'arthrite rhumatoïde.
<b>Neupro (rotigotine)</b>	Utilisé pour le traitement de la maladie de Parkinson.
<b>Nucala (mépilizumab)*</b>	Utilisé pour le traitement de l'asthme éosinophile sévère.
<b>Opdivo (nivolumab)</b>	Utilisé pour le traitement de la forme avancée ou métastatique du cancer du poumon non à petites cellules.
<b>Opdivo (nivolumab)</b>	Utilisé pour le traitement du mélanome métastatique.

Produit pharmaceutique Novateur (Nom générique)	Indication/usage
<b>Plegridy (PegIFN beta-1a)</b>	Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques rémittente (SEP rémittente).
<b>Praluent (alirocumab)</b>	Utilisé pour réduire le taux de cholestérol à lipoprotéines de basse densité (LDL) auprès de patients atteints d'hypercholestérolémie familiale hétérozygote (HeFH), ou auprès de patients présentant un risque d'événement cardiovasculaire (CV) élevé.
<b>Prolia (denosumab)</b>	Utilisé pour le traitement de l'ostéoporose.
<b>Repatha (evolocumab)</b>	Utilisé pour le traitement de l'hyperlipidémie primaire et la dyslipidémie mixte.
<b>Rosiver (ivermectine)</b>	Utilisé pour le traitement de la rosacée.
<b>Sunvepra (asunaprévir)*</b>	Utilisé pour le traitement de l'hépatite C chronique.
<b>Strensiq (asfotase alfa)</b>	Utilisé pour le traitement de l'hypophosphatasie.
<b>Technivie (ombitasvir/paritaprévir/ritonavir)</b>	Utilisé pour le traitement d'hépatite C de génotype 4.
<b>Vectibix (panitumumab)</b>	Utilisé pour le traitement du cancer colorectal métastatique.
<b>Vimizim (élosulfase alfa)*</b>	Utilisé pour le traitement de la mucopolysaccharidose de type IVA (syndrome de Morquio A).
<b>Xolair (omalizumab)</b>	Utilisé pour le traitement de l'urticaire idiopathique chronique.
<b>Xolair (omalizumab)*</b>	Utilisé pour le traitement de l'asthme persistant grave.
<b>Zepatier (elbasvir/grazoprévir)</b>	Utilisé pour le traitement d'hépatite C de génotypes 1 et 4.
<b>Zytiga (acétate d'abiratérone)</b>	Utilisé pour le traitement du cancer de la prostate se manifestant par des métastases à l'appareil génito-urinaire et résistant à la castration.

\* Nouveaux produits pharmaceutiques depuis la dernière mise à jour du 30 septembre 2016.