

## Alliance pancanadienne pharmaceutique : négociations actives

En date du 30 septembre 2015

À l'heure actuelle, 22 négociations sont **en cours** pour les produits pharmaceutiques suivants :

Produit pharmaceutique Novateur (Nom générique)	Indication/usage
<b>Actemra (tocilizumab) SC</b>	Utilisé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde.
<b>Avastin (bevacizumab)</b>	Utilisé pour le traitement du cancer du col de l'utérus persistant, récidivant, ou métastatique. Utilisé pour le traitement du cancer ovarien épithélial.
<b>Bosulif (bosutinib)</b>	Utilisé pour le traitement de la leucémie myéloïde chronique (LMC).
<b>Cimzia (certolizumab)</b>	Utilisé pour le traitement de la spondylarthrite ankylosante, l'arthrite psoriasique.
inhibiteurs de la <b>DPP-4</b> (sitagliptine, saxagliptine, linagliptine)*	Utilisé pour le traitement du diabète de type 2.
<b>Esbriet (pirféridone) demande présentée de nouveau</b>	Utilisé pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique.
<b>Inflectra (infliximab)</b>	Utilisé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, de la spondylarthrite ankylosante, de l'arthrite psoriasique, du psoriasis en plaques
<b>Kalydeco (ivacaftor)</b>	Utilisé pour le traitement de la fibrose kystique avec la mutation G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N, S549R, ou G970R.
<b>Lemtrada (alemtuzumab)</b>	Utilisé pour le traitement des personnes atteintes de SP cyclique (poussées-rémissions).
<b>Opsumit (macitentan)</b>	Utilisé pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire.
<b>Prezcobix (darunavir/cobicistat)</b>	Utilisé pour le traitement de l'infection de VIH-1.
<b>Simponi (golimumab) SC</b>	Utilisé pour le traitement de la colite ulcéreuse.
<b>Simponi (golimumab) IV</b>	Utilisé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde.
<b>Soliris (éculizumab)</b>	Utilisé pour le traitement du syndrome hémolytique et urémique atypique.
<b>Spiriva Respimat (tiotropium)</b>	Utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique.
<b>Sylvant (siltuximab)</b>	Utilisé pour le traitement de la maladie de Castleman multicentrique.
<b>Tafinlar (dabrafénib) et Mekinist (tramétinib)*</b>	Utilisé pour le traitement du mélanome métastatique (en combinaison).
<b>Xalkori (crizotinib)</b>	Utilisé pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules avancé (première ligne).
<b>Xeljanz (tofacitinib)</b>	Utilisé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde.
<b>Xolair (omalizumab)</b>	Utilisé pour le traitement de l'urticaire idiopathique chronique.
<b>Zaxine (rifaximine)</b>	Utilisé pour la réduction des risques de récurrence de l'encéphalopathie hépatique.
<b>Zydelig (idélalisib)*</b>	Utilisé pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique (LLC).

\* Nouveaux produits pharmaceutiques depuis la dernière mise à jour du 31 août 2015.

[www.pmprovinceterritoires.ca](http://www.pmprovinceterritoires.ca)