Alliance pancanadienne pharmaceutique : négociations terminées

En date du 30 avril 2015

68 négociations communes ont **pris fin**** pour les médicaments et indications suivants :

Produit pharmaceutique Novateur (Nom générique)	Indication/usage Veuillez consulter les gouvernements individuels pour les critères de remboursement spécifiques
Abraxane (nab-paclitaxel)	Utilisé pour le traitement du adénocarcinome du pancréas non résécable, localement avancé ou métastatique.
Adcetris (brentuximab)	Utilisé pour le traitement du lymphome.
Adempas (riociguat)	Utilisé pour le traitement de l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique.
Advair (xinafoate de salmétérol/propionate de fluticasone)	Utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique et de l'asthme.
Afinitor (évérolimus)	Utilisé pour le traitement de la tumeur neuroendocrine du pancréas et dans le traitement du cancer du sein.
Alimta (pemetrexed)	Utilisé pour le traitement du cancer du poumon (nouvelle indication)
Aubagio (tériflunomide)	Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques à rechute-rémission.
Breo Ellipta (Furoate de fluticasone et vilantérol)	Utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique.
Brilinta (ticagrélor) [†]	Utilisé avec l'AAS pour la prévention des accidents athérothrombotiques chez les patients aux prises avec un syndrome coronarien aigu.
Dificid (fidaxomicine)	Utilisé pour le traitement du Clostridium difficile.
Effient (prasugrel)	Utilisé avec l'AAS pour la prévention des accidents athérothrombotiques chez les patients aux prises avec un syndrome coronarien aigu.
Eliquis (apixaban)	Utilisé pour la prévention de l'AVC chez les patients souffrant de fibrillation auriculaire et pour la prévention de la thrombose veineuse profonde.
Erivedge (vismodegib)	Utilisé pour le traitement du carcinome basocellulaire métastatique.
Esbriet (pirfénidone)	Utilisé pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique.
Eylea (aflibercept)	Utilisé pour le traitement de la forme humide de la dégénérescence maculaire liée à l'âge.
Galexos (siméprévir)	Utilisé pour le traitement de l'infection de l'hépatite C chronique de génotype 1.
Gilenya (fingolimod) [†]	Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques à rechute-rémission.
Giotrif (afatinib)	Utilisé pour le traitement des mutations activatrices de RFCE, cancer du poumon non à petites cellules qui est avancé.
Halaven (éribuline)	Utilisé pour le traitement du cancer du sein.
Harvoni (sofosbuvir/lédipasvir)	Utilisé pour le traitement de l'infection de l'hépatite C chronique.
Ibavyr (ribavirine)	Utilisé pour le traitement de l'infection de l'hépatite C chronique.
Inlyta (axitinib)	Utilisé pour le traitement du carcinome métastatique des cellules rénales.
Inspra (éplérénone)	Utilisé pour le traitement d'insuffisance cardiaque systolique de classe II selon la New York Heart Association (NYHA).
Jakavi (ruxolitinib)	Utilisé pour le traitement de la myélofibrose à risque intermédiaire ou élevé.
Jetrea (ocriplasmine)	Utilisé pour le traitement de la traction vitréomaculaire symptomatique.
Kadcyla (trastuzumab emtansine)	Utilisé pour le traitement du cancer du sein métastatique de HER-2 positif.
Kalydeco (ivacaftor)	Utilisé pour le traitement de la fibrose kystique.

Veilisé pour le traitement de la phénylcétonurie.	Produit pharmaceutique Novateur (Nom générique)	Indication/usage Veuillez consulter les gouvernements individuels pour les critères de remboursement spécifiques
Mozobii (plerixafor)	Kuvan (saproptérine) [†]	Utilisé pour le traitement de la phénylcétonurie.
Utilisé conjointement avec le Facteur de stimulation des colonies de granulocytes en soutien au traitement du lymphome non hodgkinien et du mydome multiple. Myrbetriq (mirabegron)* Utilisé pour le traitement de la vessie hyperactive. Onbrez (indacatérol)† Utilisé pour le traitement de la vessie hyperactive. Onglyza (saxagliptine) Utilisé pour le traitement du diabète mellitus (diabète de type 2). Oralair (l'extrait d'allergène du pollen de l'herbe) Orencia (abatacept) Utilisé pour le traitement de la rhinite allergique avec ou sans conjonctivite. Perjeta (pertuzumab) Utilisé pour le traitement du cancer du sein. Pomatyst (pomalidomide) Utilisé pour le traitement du cancer du sein. Pomatyst (pomalidomide) Utilisé pour le traitement du myélome multiple. Pradaxa (dabigatran)† Utilisé pour le syndrome clinique isolé. Renicade (infiliximab) Utilisé pour le syndrome clinique isolé. Revlimid (ténalidomide) Utilisé pour le syndrome clinique isolé. Revlimid (ténalidomide) Utilisé pour le traitement de multiples indications, incluant la polyarthrite rhumatoide, la colite utéreuse, et la maladie de Crohn. Revlimid (ténalidomide) Utilisé pour le traitement de maintien dans les cas de myélome multiple après une transplantation de cellules souches. Sebri Breezhaler (tromure de glycopyrronium) Utilisé pour le traitement de la maladie de hémoglobinurie paroxystique nocturne. Solvadi (sofosbuvir) Utilisé pour le traitement de la maladie de hémoglobinurie paroxystique nocturne. Stribild (elvitégravir /cobicistat/emtricitabine/ténofovir) Utilisé pour le traitement de la meladie du pancréas. Tafinar (darafenib) Utilisé pour le traitement de la tumeur neuroendocrine du pancréas. Tafinar (darafenib) Utilisé pour le traitement de la tumeur neuroendocrine du pancréas. Tafinar (darafenib) Utilisé pour le traitement de la tumeur neuroendocrine du pancréas. Tafinar (darafenib) Utilisé pour le traitement de la tumeur neuroendocrine du pancréas. Tafinare (darafenib) Utilisé pour le traitement de la tumeur neuroendocr	Lodalis (colesevelam)	Utilisé pour le traitement de l'hypercholestérolémie.
granulocyrès en soutien au traitement du lymphome non hodgkinien et du myélome multiple.	Mekinist (tramétinib)	Utilisé pour le traitement du mélanome métastatique.
Onbrez (indacatérol)¹ Onglyza (saxagliptine) Utilisé pour le traitement du diabète mellitus (diabète de type 2). Oralair (l'extrait d'allergène du pollen de l'herbe) Orencia (abatacept) Utilisé pour le traitement de la rhinite allergique avec ou sans conjonctivite. Dorencia (abatacept) Utilisé pour le traitement de la rhinite allergique avec ou sans conjonctivite. Pornecia (abatacept) Utilisé pour le traitement de l'arthrite rhumatoïde. Perjeta (pertuzumab) Utilisé pour le traitement du cancer du sein. Pomalyst (pomalidomide) Utilisé pour le traitement du myélome multiple. Pradaxa (dabigatran)† Utilisé pour le prévention de l'AVC chez les patients souffrant de fibrillation auriculaire. Rebif (interféron béta-1a)* Utilisé pour le traitement de maintien sincications, incluant la polyarthrite rhumatoïde, la colite ulcéreuse, et la maladie de Crohn. Revlimid (lénalidomide) Utilisé pour le traitement de maintien dans les cas de myélome multiple après une transplantation de cellules souches. Seebri Breezhaler (bromure de glycopyrronium) Utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique. Utilisé pour le traitement de la maladie de hémoglobinurie paroxystique nocturne. Solvadi (sofosbuvir) Utilisé pour le traitement de la tuneur stromales gastro-intestinales non-résécables (inopérables) et/ou métastaliques Stribild (elvitégravir (cobicistat/emfricitabine/ténofovir) Stribild (elvitégravir) Utilisé pour le traitement de l'infection au VIH-1 chez les adultes n'ayant jamais reçu d'antirétroviraux. Sutent (sunitinib) Utilisé pour le traitement de la tuneur neuroendocrine du pancréas. Tafinar (darafenib) Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques. Triumeq (dolutégravir)* Utilisé pour le traitement du lymphome no hodykinien, du lymphome du manteau et de la leucémie lymphoïde chronique. Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1. Tudorza Genuair (Bromure d'aclidinium) Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques à rechute-rémission. Utilisé pou	Mozobil (plerixafor)	granulocytes en soutien au traitement du lymphome non hodgkinien et du
Onglyza (saxagliptine) Utilisé pour le traitement du diabète mellitus (diabète de type 2). Oralair (l'extrait d'allergène du pollen de l'herbe) Orancia (abatacept) Utilisé pour le traitement de la rhinite allergique avec ou sans conjonctivite. Perjeta (pertuzumab) Perjeta (pertuzumab) Utilisé pour le traitement du cancer du sein. Pomalyst (pomalidomide) Utilisé pour le traitement du myélome multiple. Pradaxa (dabigatran)† Utilisé pour le prévention de l'AVC chez les patients souffrant de fibrillation auriculaire. Rebif (interféron bêta-1a)* Utilisé pour le syndrome clinique isolé. Remicade (infliximab) Utilisé pour le syndrome clinique isolé. Revlimid (lénalidomide) Utilisé pour le traitement de multiples indications, incluant la polyarthrite rhumatoïde, la colite ulcéreuse, et la maladie de Crohn. Revlimid (lénalidomide) Utilisé comme traitement de maintien dans les cas de myélome multiple après une traitement de ellules souches. Seebri Breezhaler (bromure de glycopyrronium) Utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique. Soliris (éculizumab)† Utilisé pour le traitement de la maladie de hémoglobinurie paroxystique nocturne. Solvadi (sofosbuvir) Utilisé pour le traitement de l'infection de l'hépatite C chronique. Utilisé pour le traitement de l'infection de l'hépatite C chronique. Utilisé pour le traitement de l'infection au VIH-1 chez les adultes n'ayant jamais reçu d'antirétroviraux. Sutent (suntitinib) Utilisé pour le traitement de la tumeur neuroendocrine du pancréas. Tafinlar (darafenib) Utilisé pour le traitement de la tumeur neuroendocrine du pancréas. Utilisé pour le traitement de la tumeur neuroendocrine du pancréas. Utilisé pour le traitement du mélanome métastatique. Utilisé pour le traitement de la la leucénie lymphome non hodgkinien, du lymphome du manteau et de la leucémie lymphoride chronique. Triumeq (dolutégravir/abacavir/lamivudine)* Utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPCC).	Myrbetriq (mirabegron)*	Utilisé pour le traitement de la vessie hyperactive.
Oralair (l'extrait d'allergène du poilen de l'herbe) Orencia (abatacept) Orencia (abatacept) Orencia (abatacept) Orencia (abatacept) Orencia (abatacept) Orencia (abatacept) Utilisé pour le traitement de l'arthrite rhumatoïde. Perjeta (pertuzumab) Utilisé pour le traitement du cancer du sein. Pomalyst (pomalidomide) Utilisé pour le traitement du myélome multiple. Pradaxa (dabigatran) [†] Utilisé pour le syndrome clinique isolé. Remicade (infliximab) Revlimid (lénalidomide) Utilisé pour le traitement de multiples indications, incluant la polyarthrite rhumatoïde, la collie ulcéreuse, et la maladie de Crohn. Utilisé come traitement de multiples souches. Seebri Breezhaler (toremure de glycopyrronium) Utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique. Soliris (éculizumab) [†] Utilisé pour le traitement de la maladie de hémoglobinurie paroxystique nocturne. Solvadi (sofosbuvir) Utilisé pour le traitement de l'infection de l'hépatite C chronique. Utilisé pour le traitement de l'infection de l'hépatite C chronique. Utilisé pour le traitement de l'infection au VIH-1 chez les adultes n'ayant jamais repu d'antirétroviaux. Stribild (elvitégravir / cobicistat/emtricitabine/ténofovir) Sutent (sunitinib) Utilisé pour le traitement de l'infection au VIH-1 chez les adultes n'ayant jamais repu d'antirétroviaux. Sutent (sunitinib) Utilisé pour le traitement de l'infection au VIH-1 chez les adultes n'ayant jamais repu d'antirétroviaux. Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1. Treanda (bendamustine) [†] Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1. Utilisé pour le traitement du mélanome métastatique. Utilisé pour le traitement du la sclérose en plaques. Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1.	Onbrez (indacatérol) [†]	
Orencia (abatacept) Orencia (abatacept) Utilisé pour le traitement de l'arthrite rhumatoïde. Perjeta (pertuzumab) Utilisé pour le traitement du cancer du sein. Pomalyst (pomalidomide) Utilisé pour le traitement du myélome multiple. Utilisé pour la prévention de l'AVC chez les patients souffrant de fibrillation auriculaire. Rebif (interféron bêta-1a)* Utilisé pour le syndrome clinique isolé. Remicade (infliximab) Utilisé pour le traitement de multiples indications, incluant la polyarthrite rhumatoïde, la colite ulcéreuse, et la maladie de Crohn. Revlimid (lénalidomide) Utilisé comme traitement de maintien dans les cas de myélome multiple après une transplantation de cellules souches. Seebri Breezhaler (bromure de glycopyrronium) Utilisé pour le traitement de la maladie de hémoglobinurie paroxystique nocturne. Solivadi (sofosbuvir) Utilisé pour le traitement de l'infection de l'hépatite C chronique. Stivarga (régorafénib) Utilisé pour le traitement de b'infection de l'hépatite C chronique. Stivarga (régorafénib) Utilisé pour le traitement de l'infection au VIH-1 chez les adultes n'ayant jamais reçu d'antirétroviraux. Sutent (sunitinib) Utilisé pour le traitement de la tumeur neuroendocrine du pancréas. Tafinlar (darafenib) Utilisé pour le traitement de la tumeur neuroendocrine du pancréas. Utilisé pour le traitement de la bumeur neuroendocrine du pancréas. Utilisé pour le traitement de la lumeur neuroendocrine du pancréas. Utilisé pour le traitement de la lumeur neuroendocrine du pancréas. Utilisé pour le traitement de la lumeur neuroendocrine du pancréas. Utilisé pour le traitement de la lumeur neuroendocrine du pancréas. Utilisé pour le traitement de la lumeur neuroendocrine du pancréas. Utilisé pour le traitement de la lumeur neuroendocrine du pancréas. Utilisé pour le traitement de la lumeur neuroendocrine du pancréas. Utilisé pour le traitement de la lumeur neuroendocrine du pancréas. Utilisé pour le traitement de la lumeur neuroendocrine du néanceur de la lumeur neuroendoc	Onglyza (saxagliptine)	Utilisé pour le traitement du diabète mellitus (diabète de type 2).
Perjeta (pertuzumab) Dutilisé pour le traitement du cancer du sein. Pomalyst (pomalidomide) Utilisé pour le traitement du myélome multiple. Pradaxa (dabigatran)†		Utilisé pour le traitement de la rhinite allergique avec ou sans conjonctivite.
Pomalyst (pomalidomide) Utilisé pour le traitement du myélome multiple. Pradaxa (dabigatran)† Utilisé pour la prévention de l'AVC chez les patients souffrant de fibrillation auriculaire. Rebif (interféron bêta-1a)* Utilisé pour le syndrome clinique isolé. Remicade (infliximab) Utilisé pour le traitement de multiples indications, incluant la polyarthrite rhumatoride, la colite ulcéreuse, et la maladie de Crohn. Revlimid (lénalidomide) Utilisé pour le traitement de maintien dans les cas de myélome multiple après une transplantation de cellules souches. Seebri Breezhaler (bromure de glycopyrronium) Utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique. Soliris (éculizumab)† Utilisé pour le traitement de l'infection de l'hépatite C chronique. Solvadi (sofosbuvir) Utilisé pour le traitement des tumeurs stromales gastro-intestinales non-résécables (inopérables) et/ou métastatiques Stribild (elvitégravir /cobicistat/emtricitabine/ténofovir) Sutent (sunitinib) Utilisé pour le traitement de la tumeur neuroendocrine du pancréas. Utilisé pour le traitement de la tumeur neuroendocrine du pancréas. Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques. Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1. Treanda (bendamustine)† Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1. Triumeq (dolutégravir/abacavir/lamivudine)* Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1.	Orencia (abatacept)	Utilisé pour le traitement de l'arthrite rhumatoïde.
Pradaxa (dabigatran) [†] Utilisé pour la prévention de l'AVC chez les patients souffrant de fibrillation auriculaire. Rebif (interféron bêta-1a)* Utilisé pour le syndrome clinique isolé. Remicade (infliximab) Utilisé pour le traitement de multiples indications, incluant la polyarthrite rhumatoide, la colite ulcéreuse, et la maladie de Crohn. Revlimid (lénalidomide) Utilisé comme traitement de maintien dans les cas de myélome multiple après une transplantation de cellules souches. Seebri Breezhaler (bromure de glycopyrronium) Utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique. Solvadi (sofosbuvir) Utilisé pour le traitement de la maladie de hémoglobinurie paroxystique nocturne. Solvadi (sofosbuvir) Utilisé pour le traitement de l'infection de l'hépatite C chronique. Stribalid (elvitégravir / cobicistat/emtricitabine/ténofovir) Sutent (sunitinib) Utilisé pour le traitement de l'infection au VIH-1 chez les adultes n'ayant jamais reçu d'antirétroviraux. Sutent (sunitinib) Utilisé pour le traitement de la tumeur neuroendocrine du pancréas. Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques. Tricay (dolutégravir)* Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1. Treanda (bendamustine) [†] Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1. Treanda (bendamustine) [†] Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1. Triumeq (dolutégravir/abacavir/lamivudine)* Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1.	Perjeta (pertuzumab)	Utilisé pour le traitement du cancer du sein.
Rebif (interféron bêta-1a)* Utilisé pour le syndrome clinique isolé. Remicade (infliximab) Utilisé pour le traitement de multiples indications, incluant la polyarthrite rhumatoïde, la colite ulcéreuse, et la maladie de Crohn. Revlimid (lénalidomide) Utilisé comme traitement de maintien dans les cas de myélome multiple après une transplantation de cellules souches. Seebri Breezhaler (bromure de glycopyrronium) Utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique. Soliris (éculizumab)† Utilisé pour le traitement de la maladie de hémoglobinurie paroxystique nocturne. Solvadi (sofosbuvir) Utilisé pour le traitement des tumeurs stromales gastro-intestinales nonrésécables (inopérables) et/ou métastatiques Stribild (elvitégravir /cobicistat/emtricitabine/ténofovir) Sutent (sunitinib) Utilisé pour le traitement de la tumeur neuroendocrine du pancréas. Tafinlar (darafenib) Utilisé pour le traitement de la tumeur neuroendocrine du pancréas. Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques. Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1. Treanda (bendamustine)† Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1.	Pomalyst (pomalidomide)	Utilisé pour le traitement du myélome multiple.
Remicade (infliximab) Utilisé pour le traitement de multiples indications, incluant la polyarthrite rhumatoïde, la colite ulcéreuse, et la maladie de Crohn. Revlimid (lénalidomide) Utilisé comme traitement de maintien dans les cas de myélome multiple après une transplantation de cellules souches. Seebri Breezhaler (bromure de glycopyrronium) Utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique. Utilisé pour le traitement de l'infection de l'hépatite C chronique. Solvadi (sofosbuvir) Utilisé pour le traitement de l'infection de l'hépatite C chronique. Stivarga (régorafénib) Utilisé pour le traitement des tumeurs stromales gastro-intestinales non-résécables) (inopérables) et/ou métastatiques Stribild (elvitégravir / cobicistat/emtricitabine/ténofovir) Sutent (sunitinib) Utilisé pour le traitement de l'infection au VIH-1 chez les adultes n'ayant jamais reçu d'antirétroviraux. Sutent (sunitinib) Utilisé pour le traitement de la tumeur neuroendocrine du pancréas. Tafinlar (darafenib) Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques. Trecfidera (fumarate de diméthyle) Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1. Treanda (bendamustine) [†] Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1. Utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPCC). Tysabri (natalizumab) Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques à rechute-rémission.	Pradaxa (dabigatran) [†]	
rhumatoïde, la colite ulcéreuse, et la maladie de Crohn. Revlimid (lénalidomide) Seebri Breezhaler (bromure de glycopyrronium) Utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique. Utilisé pour le traitement de la maladie de hémoglobinurie paroxystique nocturne. Solvadi (sofosbuvir) Utilisé pour le traitement de la maladie de hémoglobinurie paroxystique nocturne. Stivarga (régorafénib) Utilisé pour le traitement de l'infection de l'hépatite C chronique. Stivarga (régorafénib) Utilisé pour le traitement des tumeurs stromales gastro-intestinales non-résécables (inopérables) et/ou métastatiques Stribild (elvitégravir / cobicistat/emtricitabine/ténofovir) Sutent (sunitinib) Utilisé pour le traitement de la tumeur neuroendocrine du pancréas. Utilisé pour le traitement de la tumeur neuroendocrine du pancréas. Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques. Trivicay (dolutégravir)* Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques. Trivicay (dolutégravir)* Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1. Treanda (bendamustine)† Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1.	Rebif (interféron bêta-1a)*	Utilisé pour le syndrome clinique isolé.
une transplantation de cellules souches. Seebri Breezhaler (bromure de glycopyrronium) Utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique. Soliris (éculizumab) [†] Utilisé pour le traitement de la maladie de hémoglobinurie paroxystique nocturne. Solvadi (sofosbuvir) Utilisé pour le traitement de l'infection de l'hépatite C chronique. Stivarga (régorafénib) Utilisé pour le traitement des tumeurs stromales gastro-intestinales non-résécables (inopérables) et/ou métastatiques Stribild (elvitégravir / cobicistat/emtricitabine/ténofovir) Sutent (sunitinib) Utilisé pour le traitement de l'infection au VIH-1 chez les adultes n'ayant jamais reçu d'antirétroviraux. Sutent (sunitinib) Utilisé pour le traitement de la tumeur neuroendocrine du pancréas. Tafinlar (darafenib) Utilisé pour le traitement du mélanome métastatique. Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques. Tivicay (dolutégravir)* Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1. Treanda (bendamustine) [†] Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1.	Remicade (infliximab)	
tutilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique. Utilisé pour le traitement de la maladie de hémoglobinurie paroxystique nocturne. Solvadi (sofosbuvir) Utilisé pour le traitement de l'infection de l'hépatite C chronique. Stivarga (régorafénib) Utilisé pour le traitement des tumeurs stromales gastro-intestinales non-résécables (inopérables) et/ou métastatiques Stribild (elvitégravir / cobicistat/emtricitabine/ténofovir) Sutent (sunitinib) Utilisé pour le traitement de l'infection au VIH-1 chez les adultes n'ayant jamais reçu d'antirétroviraux. Sutent (sunitinib) Utilisé pour le traitement de la tumeur neuroendocrine du pancréas. Tafinlar (darafenib) Tecfidera (fumarate de diméthyle) Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques. Tivicay (dolutégravir)* Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1. Treanda (bendamustine) [†] Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1.	Revlimid (lénalidomide)	
Solvadi (sofosbuvir) Utilisé pour le traitement de l'infection de l'hépatite C chronique. Stivarga (régorafénib) Stribild (elvitégravir / cobicistat/emtricitabine/ténofovir) Sutent (sunitinib) Utilisé pour le traitement de l'infection au VIH-1 chez les adultes n'ayant jamais reçu d'antirétroviraux. Sutent (sunitinib) Utilisé pour le traitement de la tumeur neuroendocrine du pancréas. Tafinlar (darafenib) Utilisé pour le traitement du mélanome métastatique. Tecfidera (fumarate de diméthyle) Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques. Tivicay (dolutégravir)* Utilisé pour le traitement du lymphome non hodgkinien, du lymphome du manteau et de la leucémie lymphoïde chronique. Triumeq (dolutégravir/abacavir/lamivudine)* Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1. Utilisé pour le traitement de l'a maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques à rechute-rémission. Utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique chronique obstructive chronique (MPOC).		Utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique.
Stivarga (régorafénib) Utilisé pour le traitement des tumeurs stromales gastro-intestinales non-résécables (inopérables) et/ou métastatiques Stribild (elvitégravir /cobicistat/emtricitabine/ténofovir) Sutent (sunitinib) Utilisé pour le traitement de l'infection au VIH-1 chez les adultes n'ayant jamais reçu d'antirétroviraux. Sutent (sunitinib) Utilisé pour le traitement de la tumeur neuroendocrine du pancréas. Tafinlar (darafenib) Utilisé pour le traitement du mélanome métastatique. Tecfidera (fumarate de diméthyle) Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques. Tivicay (dolutégravir)* Utilisé pour le traitement du lymphome non hodgkinien, du lymphome du manteau et de la leucémie lymphoïde chronique. Triumeq (dolutégravir/abacavir/lamivudine)* Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1. Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1. Utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Tysabri (natalizumab) Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques à rechute-rémission. Utilibro	Soliris (éculizumab) [†]	,
stribild (elvitégravir /cobicistat/emtricitabine/ténofovir) Sutent (sunitinib) Utilisé pour le traitement de l'infection au VIH-1 chez les adultes n'ayant jamais reçu d'antirétroviraux. Sutent (sunitinib) Utilisé pour le traitement de la tumeur neuroendocrine du pancréas. Tafinlar (darafenib) Utilisé pour le traitement du mélanome métastatique. Tecfidera (fumarate de diméthyle) Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques. Tivicay (dolutégravir)* Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1. Utilisé pour le traitement du lymphome non hodgkinien, du lymphome du manteau et de la leucémie lymphoïde chronique. Triumeq (dolutégravir/abacavir/lamivudine)* Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1. Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1. Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques à rechute-rémission. Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques à rechute-rémission. Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques à rechute-rémission.	Solvadi (sofosbuvir)	Utilisé pour le traitement de l'infection de l'hépatite C chronique.
Jamais reçu d'antirétroviraux.	Stivarga (régorafénib)	
Tafinlar (darafenib) Utilisé pour le traitement du mélanome métastatique. Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques. Tivicay (dolutégravir)* Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1. Utilisé pour le traitement du lymphome non hodgkinien, du lymphome du manteau et de la leucémie lymphoïde chronique. Triumeq (dolutégravir/abacavir/lamivudine)* Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1. Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1. Utilisé pour la gestion de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Tysabri (natalizumab) Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques à rechute-rémission. Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques à rechute-rémission.		
Tecfidera (fumarate de diméthyle) Tivicay (dolutégravir)* Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1. Utilisé pour le traitement du lymphome non hodgkinien, du lymphome du manteau et de la leucémie lymphoïde chronique. Triumeq (dolutégravir/lamivudine)* Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1. Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1. Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1. Utilisé pour la gestion de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Tysabri (natalizumab) Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques à rechute-rémission.	Sutent (sunitinib)	Utilisé pour le traitement de la tumeur neuroendocrine du pancréas.
Triumeq (dolutégravir/abacavir/lamivudine)* Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1. Utilisé pour le traitement du lymphome non hodgkinien, du lymphome du manteau et de la leucémie lymphoïde chronique. Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1. Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1. Utilisé pour la gestion de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Tysabri (natalizumab) Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques à rechute-rémission. Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques à rechute-rémission.	Tafinlar (darafenib)	Utilisé pour le traitement du mélanome métastatique.
Triumeq (dolutégravir/abacavir/lamivudine)* Tudorza Genuair (Bromure d'aclidinium) Utilisé pour le traitement du lymphome non hodgkinien, du lymphome du manteau et de la leucémie lymphoïde chronique. Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1. Utilisé pour la gestion de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Tysabri (natalizumab) Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques à rechute-rémission. Utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).	Tecfidera (fumarate de diméthyle)	Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques.
Triumeq (dolutégravir/abacavir/lamivudine)* Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1. Utilisé pour la gestion de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Tysabri (natalizumab) Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques à rechute-rémission. Ultibro	Tivicay (dolutégravir)*	Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1.
(dolutégravir/abacavir/lamivudine)* Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1. Tudorza Genuair (Bromure d'aclidinium) Utilisé pour la gestion de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Tysabri (natalizumab) Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques à rechute-rémission. Ultibro Litilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).	Treanda (bendamustine) [†]	
d'aclidinium) (MPOC). Tysabri (natalizumab) Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques à rechute-rémission. Ultibro Litilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique.		Utilisé pour le traitement de l'infection VIH-1.
Ultibro Litilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique	· ·	
I litilica nour la traitament de la maladia nulmonaire obetructiva chronique	Tysabri (natalizumab)	Utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques à rechute-rémission.
(indacaterongrycopyrronium)	Ultibro (indacatérol/glycopyrronium)*	Utilisé pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive chronique.
Valtrex (valacyclovir) Utilisé pour le traitement d'infections virales spécifiques.	Valtrex (valacyclovir)	Utilisé pour le traitement d'infections virales spécifiques.

Produit pharmaceutique Novateur (Nom générique)	Indication/usage Veuillez consulter les gouvernements individuels pour les critères de remboursement spécifiques
Votrient (pazopanib)	Utilisé pour le traitement du carcinome métastatique des cellules rénales.
Xalkori (crizotinib)	Utilisé pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules.
Xarelto (rivaroxaban) [†]	Utilisé pour la prévention de l'AVC chez les patients souffrant de fibrillation auriculaire et pour la prévention de la thrombose veineuse profonde.
Xarelto (rivaroxaban)	Nouvelle indication pour le traitement des événements thromboemboliques veineux et la prévention de la thrombose veineuse profonde récurrente et embolie pulmonaire.
Xtandi (enzulatamide)	Utilisé pour le cancer de la prostate résistant à la castration.
Yervoy (ipilimumab) [†]	Utilisé pour le traitement de deuxième intention du mélanome métastatique ou non résécable chez les patients adultes.
Yervoy (ipilimumab)	Utilisé pour le traitement de première intention du mélanome avancé métastatique ou non résécable chez les patients adultes.
Zytiga (abiratérone)	Utilisé pour le traitement du cancer de la prostate.
2 négociations ont pris fin sans qu'une entente puisse être conclue.	
Byetta (Exénatide)	Utilisé pour le traitement du diabète de type 2.
Victoza (liraglutide)	Utilisé pour le traitement du diabète de type 2.

^{**} Par négociations pancanadiennes qui ont pris fin, on entend toute négociation pour laquelle une déclaration d'intention (un document décrivant les termes de l'entente et les conditions d'inclusion à la liste) a été signée entre le gouvernement qui dirige la négociation et le fabricant.

† Les neuf premiers produits pharmaceutiques négociés par l'Alliance pancanadienne pharmaceutique.

* Les négociations complétées depuis la dernière mise à jour du 31 mars 2015.